

院内採用 吸入薬一覧 Ver.16

分類	商品名・規格	一般名	一容器吸入回数	用法	一日最大量	剤形	適応症		採用区分	長期投与可否	
							気管支喘息	COPD			
ステロイド	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	シクレソニド	56回	100~400 μ g 1日1回(適宜増減)	800 μ g (朝・夜の1日2回に分けて投与)	エアゾール製剤	○		患者限定	○	
	キューパール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	100回	1回100 μ g 1日2回(適宜増減)	800 μ g	エアゾール剤	○			○	
	アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30回	1回1吸入 1日1回	1回1吸入 1日1回	ドライパウダー製剤	○			○	
β 2受容体刺激薬	LABA	オンプレス吸入用カプセル150 μ g	インダカテロールマレイン酸塩	7cap/シート	1回1カプセル 1日1回	1回1カプセル 1日1回	吸入用カプセル	○			○
		セレバント50ディスクス	サルメテロールキシナホ酸塩	60プリスター	1回50 μ g 1日2回 朝及び就寝前	1回50 μ g 1日2回	ドライパウダー製剤	○	○		○
	SABA	サルタノールインヘラー100 μ g	サルブタモール硫酸塩	約200回	1回200 μ g (2吸入)(適宜増減)	1回2吸入 1日4回(8吸入)	エアゾール製剤	○	○		○
		メプチンスイングヘラー10 μ g	ブロカテロール塩酸塩水和物	100回	1回20 μ g(2吸入) (適宜増減)	1回2吸入 1日4回(8吸入)	ドライパウダー製剤	○	○		○
抗コリン薬	LAMA	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g	チオトロピウム臭化物水和物	7cap/シート	1回1カプセル 1日1回	1回1カプセル 1日1回	吸入用カプセル	○			○
		スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	30回分(計60噴霧)	1回2吸入 1日1回	1回2吸入 1日1回	ソフトミスト吸入器	○	○		○
		シープリー吸入用カプセル50 μ g	グリコピロニウム臭化物	7cap/シート	1回1カプセル 1日1回	1回1カプセル 1日1回	吸入用カプセル		○		○
LABA+ステロイド	アドエア250ディスクス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩 フルチカゾンプロピオン酸エステル	60回	1回1吸入 1日2回 (気管支喘息・慢性閉塞性肺疾患)	1回1吸入 1日2回	ドライパウダー製剤	○	○		○	
	アドエア500ディスクス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩 フルチカゾンプロピオン酸エステル		1回1吸入 1日2回(気管支喘息)			○		○		
	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ホルモテロールフルマル酸塩水和物 ブデソニド	60回	1回1吸入 1日2回(気管支喘息) 1回2吸入 1日2回(慢性閉塞性肺疾患)	<気管支喘息> 定期吸入:1回4吸入 1日2回(計8吸入) 頓用吸入:定期吸入が1日2吸入の場合6吸入まで 定期吸入が1日4吸入の場合4吸入まで (定期吸入と頓用吸入を合わせて1日通常8吸入まで 可能。一時的に1日12吸入まで可能。) <慢性閉塞性肺疾患> 1回2吸入 1日2回	○	○		○		
	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	ホルモテロールフルマル酸塩水和物 フルチカゾンプロピオン酸エステル	120回	1回2~4吸入 1日2回吸入	1回4吸入 1日2回	エアゾール剤	○			○	
	レルベア100エリプタ30吸入	ビランテロールトリフェニル酢酸塩 フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30回	1回1吸入 1日1回	1回1吸入 1日1回	ドライパウダー製剤	○	○		○	
	レルベア200エリプタ30吸入	ビランテロールトリフェニル酢酸塩 フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30回	1回1吸入 1日1回	1回1吸入 1日1回	ドライパウダー製剤	○			○	
	LAMA+LABA	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物 ビランテロールトリフェニル酢酸塩	30回	1回1吸入 1日1回	1回1吸入 1日1回	ドライパウダー製剤		○		○
ウルティプロ吸入カプセル		グリコピロニウム臭化物 インダカテロールマレイン酸塩	7cap/シート	1回1カプセル 1日1回	1回1カプセル 1日1回	ドライパウダー製剤		○		○	
スピオルトレスピマット60吸入		チオトロピウム臭化物水和物 オダテロール塩酸塩	30回分(計60噴霧)	1回2吸入 1日1回	1回2吸入 1日2回	ソフトミスト吸入器		○		○	
LAMA+LABA+ICS	テルリジー100エリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物 ビランテロールトリフェニル酢酸塩 フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30回	1回1吸入 1日1回	1回1吸入 1日1回	ドライパウダー製剤	○	○		○	
	テルリジー200エリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物 ビランテロールトリフェニル酢酸塩 フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30回	1回1吸入 1日1回	1回1吸入 1日1回	ドライパウダー製剤	○		患者限定	○	
	ビレーズトリエアロソフィア56吸入	グリコピロニウム臭化物 ホルモテロールフルマル酸塩水和物 ブデソニド	56回	1回2吸入 1日2回	1回2吸入 1日2回	エアゾール剤		○		○	